

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 222778 9800
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 66/2018 - PR

Processo Administrativo: 5151/2018
Processo de Licitação: 5151/2018
Data do Processo: 24/09/2018

ANEXO IV

Folha: 1

<p>Condições de Pagto: Conforme condições</p> <p>Forma de Reajuste:</p> <p>Validade da Proposta:</p> <p>Prazo Entrega/Exec.: Conforme condições</p> <p>Local de Entrega: Conforme Condições - -</p>	<p>Dotações:</p>	
<p>Objeto da Licitação: Referente aos serviços de dedetização e desratização das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.</p>	<p>Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.</p>	<p><u>Carimbo do CNPJ do Fornecedor</u></p>
<p>Observações:</p>	<p>----- Assinatura e Carimbo do Fornecedor</p>	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	26675,020	M2	Dedetização com bomba pulverizadora completa contra baratas, pulgas, formigas, percevejos, cupins, marimbondos, moscas e mosquitos. Material utilizado: inseticida piretóide- concentrado emulsionável (CE)- fórmula líquida. Pó molhável(PM)- Formulação em pó dispersível em água. Fórmula empírica C22H19Cl2NO2, concentrado emulsionável(CE)-250g de cipermetrina por litro (25%), pó molhável(PM)- 400g de cipermetrina por Kg(40%). É fotoestável, não apresenta odor, não mancha e não é corrosivo. (19-44-0079)	0,19	_____	_____	_____
2	26675,020	M2	Desratização completa contra roedores. Material utilizado: iscas peletizadas, o produto brodifacoum-raticida anticoagulante dose única, de coloração avermelhada, embaladas em envelopes de 25g. Fórmula empírica C31H23O2Br, é solúvel em clórfmio. Moderadamente solúvel em acetona, benzina, etanol, acetato de etila, glicerol. Não solúvel em água. Seu modo de ação é anticoagulante, interompe o ciclo de formação da vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue causando hemorragias. A morte ocorrerá somente 5 a 7 dias após a ingestão. A aplicação será de isca peletizada, a cada 5-10 metros. (19-44-0080)	0,19	_____	_____	_____
Total:				10.136,51	_____	_____	_____

Total por Extenso: (_____)

Casimiro de Abreu, 24 de Setembro de 2018